# Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-12 G



**Avertissement destiné aux Agriculteurs du Lauragais, de la Piège et du Razès "rédigé en collaboration" avec les GDA, les Coopératives et la ferme de Loudes**

**N° 1 C du 19/03/92** **GRANDES CULTURES N° 1**

| | | |
|---|---|---|
| *COLZA* | : MELIGETHES | .... Traitez |
| *POIS* | : SITONES | .... Dans certaines parcelles observez et traitez éventuellement |
| *BLE* | : Très bon état sanitaire | |




**On note une très importante sortie de MELIGETHES, ces ravageurs sont présents à un stade de grande sensibilité du colza, stade E pour la plupart des plantes; seuls quelques pieds sont à F1 (premières fleurs écloses).**
**Une intervention immédiate s'impose, le risque de dégâts est d'autant plus important qu'il n'y a pas de fleurs épanouies.**
**Ce seuil est de 2 à 3 méligèthes par plante au stade actuel du colza (boutons écartés)**







H°J0 45051

1992 : N° 1-2, 5bis


*MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE*
**SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX**
ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67 92 41 42





P 8

Imprimerie de la Station d'Avertissements Agricoles - Le Directeur, M. FREYDIER - N° d'inscription 531 AD

Vous avez le choix dans les spécialités suivantes :

| | | |
|---|---|---|
| **FASTAC** | 0.15 | **L/HA** |
| **TALSTAR** | 0.1 | **L** |
| **BAYTHROID** | 0.2 | **L** |
| **DECIS CE** | 0.2 | **L** |
| **SUMI ALPHA** | 0.5 | **L** |
| **KARATE** | 0.1 | **L** |
| **TRACKER 108EC** | 0.065 | **L** |

Nous avons pu observer sur d'autres Crucifères, très localement, la présence importante de **PUCERONS CENDRES DU CHOU.**
Observez soigneusement vos parcelles et si vous constatez leur présence, préférez alors la spécialité **KARATE à 0.15 L/HA**

## POIS PROTEAGINEUX

**SITONES** : des morsures sont observables sur cultures de pois; les attaques sont dommageables sur plantes jeunes (stade 5 cm); au stade 10 cm si les morsures affectent plus de la moitié des folioles, vous pouvez traiter à l'aide d'une des solutions suivantes :

| | | |
|---|---|---|
| **DECIS** | 0.250 | **L/HA** |
| **KARATE** | 0.125 | **L** |
| **TRACKER 108EC** | 0.08 | **L** |
| **SUMI ALPHA** | 0.4 | **L** |



En cas de doutes consultez votre technicien
ou la Protection des Végétaux.




La plupart des cultures sont au stade redressement.
Nous n'observons pas pour le moment de maladies des organes aériens; la Rouille Brune est totalement absente; il semble bien que nous nous acheminions à nouveau vers une campagne très calme vis à vis de cette maladie.
Les Septorioses ainsi que l'oïdium sont également absents.
Les maladies du pied, observables de-ci de-là, en les cherchant bien sont sans gravité pour le moment.
Par contre les symptômes de Viroses : VMB et VMJB sont visibles; aucun moyen de lutte n'existant pas pour ces maladies, on ne peut que constater.